

riés que ceux des autres espèces. Il possède la faculté de gonfler fortement son larynx et, en même temps, il peut transformer son voile de palais, énorme, en une vessie remplie d'air. Il produit d'abord une sorte de roucoulement, puis un gloussement et, enfin, tout l'air est expulsé par les narines, ce qui produit un renflement sonore.

---

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE LÉPIDOPTÈRE DE PERSE,

PAR G.-A. POULADE.

*Zygæna Escaleraï* Pouj. — Envergure : 0,021 millim.

Ailes supérieures noires à reflets verdâtres ou violacées avec trois grandes taches orangées : la basilaire occupant entièrement le tiers de l'aile, sauf un très petit espace noir contre le thorax ; la médiane, plus ou moins de la forme d'un talon renversé, résultant de la fusion de deux taches, dont la supérieure envahit la côte et l'inférieure approche de très près le bord interne enfin celle de l'apex, également formée de deux taches dont la supérieure touche la côte ou à peu près, et l'inférieure, plus longue dans le sens vertical, atteint presque le bord externe.

Ailes inférieures d'une couleur orangée fondue en rouge minium à la côte et au bord interne et *laissant le disque diaphane* ; la frange et la bordure sont d'un noir violacé chatoyant ; cette dernière forme une tache assez large à l'apex et une autre plus ou moins marquée à la dépression du milieu du bord externe.

Tête et thorax noirâtres, les ptérygodes, le front et les palpes sont d'un rouge minium plus ou moins fondu en couleur chair, le collier et l'abdomen également rouges et les côtés de l'anus noirâtres ; les pattes sont jaunâtres, les antennes noires, atteignant en longueur à peu près les deux tiers de l'aile supérieure.

Dessous des ailes semblables au-dessus : un point noir apparaît quelquefois au-dessus de la partie diaphane des inférieures.

Trois mâles du Haut-Kharoum, Chindáar (vallée) en Perse, pris en juillet 1899 par M. de la Escalera.

Deux sont offerts au Muséum par M. René Oberthür.

---